

核准日期：2007年04月23日
修改日期：2014年12月01日
修改日期：2016年09月20日
修改日期：2020年08月05日



环磷腺苷注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称：环磷腺苷注射液


商品名称：韦安

英文名称：Adenosine Cyclophosphate Injection

汉语拼音：Huanlinxiangan zhusheye

【成份】本品主要成份为：环磷腺苷

化学结构式：



分子式： $C_{10}H_{12}N_5O_6P \cdot H_2O$

分子量：347.22

辅料名称：氢氧化钠、注射用水。

【性状】本品为无色或几乎无色的澄明液体。

【适应症】用于心绞痛、心肌梗死、心肌炎及心源性休克。对改善风湿性心脏病的心悸、气急、胸闷等症状有一定的作用。对急性白血病结合化疗可提高疗效，亦可用于急性白血病的诱导缓解。此外，对老年慢性支气管炎、各种肝炎和银屑病也有一定疗效。

【规格】2ml:20mg

【用法用量】静脉注射，一次20mg，溶于20ml 0.9%氯化钠注射液中推注，一日2次。静脉滴注，本品40mg溶于250~500ml 5%葡萄糖注射液中，一日1次。冠心病以15日为一疗程，可连续应用2~3疗程；白血病以一个月为一疗程；银屑病以2~3周为一疗程，可延长使用到4~7周，每日用量可增加至60~80mg。

【不良反应】偶见发热和皮疹。大剂量静脉注射（按体重每分钟达0.5mg/kg）时，可引起腹痛、头痛、肌痛、睾丸痛、背痛、四肢无力、恶心、手脚麻木、高热等。

【禁忌】尚不明确。

【注意事项】尚不明确。

【孕妇及哺乳期妇女用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【儿童用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】环磷腺苷为蛋白激酶致活剂，系核苷酸的衍生物。是在人体内广泛存在的一种具有生理活性的重要物质，由三磷酸腺苷在腺苷环化酶催化下生成，能调节细胞的多种功能活动。作为激素的第2信使，在细胞内发挥激素调节生理机能和物质代谢作用，能改变细胞膜的功能，促使网织肌浆质内的钙离子进入肌纤维，从而增强心肌收缩，并可促进呼吸链氧化酶的活性，改善心肌缺氧，缓解冠心病症状及改善心电图。此外，对糖、脂肪代谢、核酸、蛋白质的合成调节等起着重要的作用。

【药代动力学】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【贮藏】密闭，在凉暗处（避光并不超过20℃）保存。

【包装】低硼硅玻璃安瓿，6支/盒、10支/盒。

【有效期】24个月。

【执行标准】国家药品标准YBH17952005-2014Z

【批准文号】国药准字H20051313

【上市许可持有人】

名称：中孚药业股份有限公司

注册地址：山东省潍坊市寒亭区禹王北街2709号

【生产企业】



企业名称：中孚药业股份有限公司

生产地址：山东省潍坊市寒亭区

禹王北街2709号

邮政编码：261100

电话：0536-2206826

网址：<http://www.zhongfupharm.com>