

拉米夫定片说明书
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警告语: 拉米夫定有导致乳酸酸中毒的危险。中止使用拉米夫定可能导致HBV/HIV-1双重感染患者的乙型肝炎恶化。
【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【不良反应】: 头痛, 恶心或呕吐, 腹泻, 腹痛, 疲乏, 肌痛, 皮疹, 瘙痒, 关节痛, 流感样症状, 呼吸困难, 咳嗽, 肺病, 肝酶升高, 骨痛, 肌痛, 肌肉骨骼痛, 骨折。
【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

表1 儿童患者服用拉米夫定的推荐剂量
体重(kg) | 使用150mg剂型的剂量 | 每日总剂量
14-21 | 1/2片(75mg) | 1/2片(75mg) | 150mg
>21-30 | 1/2片(75mg) | 1片(150mg) | 225mg
>30 | 1片(150mg) | 1片(150mg) | 300mg

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

表2 根据肌酐清除率成人和青少年患者(≥30kg)的剂量调整
肌酐清除率(mL/min) | 拉米夫定的建议剂量
>=50 | 每次150mg, 每日二次, 或每次300mg, 每日一次
30-49 | 每日一次, 每次150mg, 每日一次
15-29 | 每日一次, 剂量150mg, 以后每剂100mg
5-14 | 每日一次, 剂量150mg, 以后每剂50mg
<5 | 每日一次, 剂量50mg, 以后每剂25mg

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

表3 拉米夫定(EPV)与替米夫定(RTR)联合治疗的不良事件发生率
不良事件 | 拉米夫定150mg每日二次+RTR(n=251) | RTR(n=230)

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

表4 在四项24周终点研究中, 拉米夫定治疗组与对照组的不良事件发生率
不良事件 | 拉米夫定+RTR(n=251) | RTR(n=230) | 安慰剂+拉米夫定(n=251) | 安慰剂(n=230)

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

表5 在五项终点研究中, 拉米夫定治疗组与对照组的不良事件发生率
不良事件 | 拉米夫定+RTR(n=251) | RTR(n=230) | 安慰剂+拉米夫定(n=251) | 安慰剂(n=230)

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

【用法用量】: 成人和16岁以上的青少年患者: 每日一次, 每次150mg。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。
【用法用量】: 儿童患者: 每日一次, 每次150mg/1.73m²体表面积。

中孚药业股份有限公司
ZHONGFU PHARMA
企业名称: 中孚药业股份有限公司
生产地址: 山东省潍坊市寒亭区禹王北街2709号
邮政编码: 261100
电话: 0536-2206226
网址: http://www.zhongfupharma.com